

fekvés előtt, emésztési zavarok esetén naponta egyszer, az egyik főétkezés után bőséges folyadékkal ajánlott a tableta bevétele.

#### **Napi ajánlott adag:**

Bélrenyhesség és székrekedés esetén felnőtteknek 1–2 tableta, emésztési zavarok kezelésére naponta 1 tableta.

#### **Milyen nem kívánt hatást válthat ki a Darmpflege?**

– Ha olyan nem várt hatást észlel, mely nem szerepel az alábbi leírásban, forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.

– Minden gyógyhatású készítménynek lehet nem kívánt hatása még előírászerű alkalmazás esetén is. Jelen esetben

görcsös gyomor-bélpanasz előfordulhat.

– Az előírtnál hosszabb ideig, ill. adagban történő alkalmazása során ritkán májkárosodás, béltónus hiánya, béltágulat, elektrolitvesztés (főleg kálium) előfordulhat. A vizelet opálos vagy vöröses színű lehet. A tableta túlzott alkalmazása során a bélnyálkahártyán festékanyag-szerű lerakódás is előfordulhat.

#### **Mire kell még ügyelnie a tableta szedése során?**

A Darmpflege-vel egyidejűleg egyéb hashajtó tartalmú készítményt ne szedjen.

#### **Mennyi ideig szedhető a Darmpflege?**

Óvakodni kell a hosszabb ideig történő alkalmazástól. Rövid ideig – 1–2 hétig – tör-

tendő szedése ajánlott.

#### **Hogyan kell tárolni a tablettát?**

Legfeljebb 25°C-on, száraz helyen.

**Nyilvántartási szám:** OGYI-127/1989

**Csomagolási egység:** 42 db tableta/  
doboz

#### **A forgalomba hozatali engedély jogosultja:**

Dronania Traditionelle Arzneimittell  
aus Bad Wörishofen GmbH

Karl-Benz-Str. 3

D-86825 Bad Wörishofen, Germany.

#### **Magyarországon forgalmazza:**

VOLMIX Kft.

1146 Budapest, Thököly út 76.



**Dr. Kleinschrod's Kräutertabletten**

## **Wörishofener Darmpflege**

A tableta emésztést elősegítő, enyhe hashajtó hatású gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény.

Hatását évtizedes felhasználási tapasztalat és szakirodalmi adatok igazolják.

## **BETEGTÁJÉKOZTATÓ**

Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírás szerű alkalmazása.

Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

### **Mi a hatóanyaga?**

1 tableta tartalma: 81,5 mg kutyabengekér (Frangulae cortex)-, 45,0 mg szennalevél (Sennae folium)-, 45,0 mg aloe (Aloe capensis)-, 29,7 mg torma (Armoraciae radix)-, és 3,38 mg fokhagyma (Allii sat. bulbi) porított formában/tabletta

### **Mit tartalmaz még a tableta?**

A tableta egyéb összetevői:

- hatásfokozók: szappanfűgyökér-, lenmag-, köménytermés-, benedekfű-, katángkórógyökér-, tárnicsgyökér-, kökényvirág-, gyermekláncfű-, cickafarkfű-, édesköménytermés-, fehérürömfű-, ezerjófű-, narancshéj-, borókabogyó-, borsmentalevél-, kakukkfű porított formában/tabl.

- tablettázási sedédanyagok: laktóz, glükóz, szilícium-dioxid, kalcium-foszfát.

### **Mikor ajánlott a Darpflege szedése?**

Ha ön székrekedési (aranyér, sérv stb.) és bélrenyheségi problémáit szeretné rendezni, ill. ha emésztési zavarai vannak.

### **Mikor nem szabad a Darpflege-t szedni?**

Ne szedjen Darpflege-t, ha allergiás a tableta valamelyik összetevőjére, ha laktóz intoleranciája van, netán cukorbeteg. Ha panaszait ismeretlen alhasi fájdalom, belek akut gyulladása vagy bélelzáródás okozza, ne szedje a tablettát.

### **Mit kell tudnia a szedés megkezdése előtt?**

Tudnia kell, hogy orvosolandó problémái milyen eredetűek. Amennyiben bizonytalan a tünetek okában, úgy forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.

### **Szedhetik-e a Darpflege-t gyermekek is?**

A tableta biztonságos felhasználását 12 éves kor felett ajánlják.

### **Szedhető-e a Darpflege más gyógyszerekkel?**

Ha a tablettával egyidejűleg szívglükozidot, szívritmus szabályozó és tiazid típusú vízhajtót, mellékvesekéreg hormont, valamint édesgyökér tartalmú készítményt szed, feltétlen tartsa be az előírt alkalmazási időt, adagot. A felsorolt készítményekkel egyidejűleg az előírtnál hosszabb ideig szedett

Darmpflege a készítmények hatását megváltoztatja.

### **Mit kell megfontolnia várandós állapotban és szoptatás idején?**

Az antranoid tartalmú hashajtó készítmények biztonságos felhasználását várandós és szoptató anyáknál nem határozták meg. A tableta hatóanyagai a véráram útján átkerülhetnek a magzatba, ill. az anyatejjel a csecsemőbe, ezért szedését nem javasolják. Várandós és szoptató anyák a székrekedést, bélrenyheséget egészséges életmóddal próbálják rendezni.

### **Hogyan és mikor kell a Darpflege-t bevenni?**

Bélrenyheség és székrekedés esetén le-