

kezésre. Terhes és szoptató anyák **kizárólag** kezelőorvosukkal történt megbeszélés után, az ő javaslatára, vagy beleegyezésével szedjék a tablettákat.

Hogyan és mikor kell bevenni a tablettákat?
Naponta 3-szor 3–5 tablettát, étkezés után kevés folyadékkal kell lenyelni.

Milyen nem kívánt mellékhatást válthat ki a tabletták?

A javasolt alkalmazás mellett mellékhatás nem ismeretes.

Mit kell még tudni az alkalmazásról?

A készítményt cukorbetegség is alkalmazhatják.

Mire kell ügyelni a tabletták szedése során?

Epe- és epehólyag-bántalmak okozta panaszok esetén kizárólagos alkalmazása nem elegendő. Minden nem várt hatás, vagy mellékhatás fellépéséről tájékoztassa kezelőorvosát, vagy gyógyszerészét.

Mennyi ideig szedhető a tabletták?

A tabletták szedése kúraszerűen 4–5 hétig javasolt. A kúrák évenként 2–3 alkalommal ismételhetők.

Hogyan kell tárolni a tablettákat?
Szobahőmérsékleten (15–25 °C-on), száraz helyen.

A készítmény gyermekek elől elzárva tartandó!

Nyilvántartási szám: OGYI-265/1992

Gyártja: DRONANIA Traditionelle Arznei-mittel aus Bad Wörishofen GmbH

Forgalmazza: VOLMIX Kft.
1146 Budapest, Thököly út 76.

11/04

Betegtájékoztató



Dr. Kleinschrod's

Wörishofener

Leber- und Gallenpflege

Dronania GmbH

Hatás/tulajdonság:

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását több évtizedes tapasztalat, és népgyógyászati alkalmazás igazolja. A készítmény összetevőit külön-külön is régóta alkalmazza a gyógynövény-terápia.

A tabletták növényi összetevőinek anyagai cholagog (epehajtó), carminatív- (szélhajtó), emésztést elősegítő, étvágyjavító-, bacteriostaticus- (baktériumok szaporodását gátló), antiflogisticus- (gyulladáscsökkentő), spasmolyticus- (görcsoldó) és fájdalomcsillapító hatásúak.

Mit tartalmaz a tabletták?

1 tabletták tartalma: 52,0 mg Chelidonii herba (vérehulló fecskefű), 37,44 Curcumae rhizoma (kurkuma), 20,80 mg Agrimoniae herba (apróbojtorjánfű), 20,80 mg Taraxaci radix cum herba (gyermekláncfű), 20,80 mg Raphani radix (feketeretek), 16,64 mg Frangulae cortex (kutyabengékéreg), 10,40 mg Cichorii radix (katángkóró), 7,28 mg Cardui mariae herba (máriatövis), 6,24 mg Carvi fructus (kömény), 6,24 mg Salviae folium (zsályalevél), 5,20 mg Berberidis radix (sóska-borbotlyaggyökér), és 4,16 mg Millefolii herba (cickafarkfű) porrá aprítva.

Mit tartalmaz még a tabletták?

A tabletták a növényi hatóanyagokon kívül tablettázási segédanyagokat tartalmaz, úgymint: laktóz, kalcium-sztearát, kalcium-hidrogénfoszfát és koloid szilícium-dioxid.

Mikor ajánlott a Dr. Kleinschrod's Wörishofener Leber- und Gallenpflege tabletták szedése?

Ha Önnek epekő-, epehólyag-bántalom okozta panaszai vannak, akkor önmagában vagy a gyógyszeres kezelés kiegészítésére ajánlott a készítmény.

Mikor nem szabad a Dr. Kleinschrod's féle

Wörishofener Leber- und Gallenpflege tabletták szedni?

- összetevőikkel szembeni egyéni érzékenység, - bélelzáródás, a belek akut gyulladásos megbetegedései esetén ne szedje a tablettákat.

Mit kell tudnia a tabletták szedésének megkezdése előtt?

Tudnia kell, hogy egy tabletták kb. 20,5 mg laktózt (tejcukrot) tartalmaz.

Szedhetik-e gyermekek a tablettákat?

A tabletták szedése elsősorban felnőttek

számára javasolt. Indokolt esetben csak 12 éves kor feletti gyermekeknek adható a készítmény.

Szedhető-e más gyógyszerekkel együtt a Dr. Kleinschrod's féle Wörishofener Leber- und Gallenpflege tabletták?

Más gyógyszerekkel való együttadás tilására vonatkozó adatok és tapasztalatok nem állnak rendelkezésre.

Mit kell megfontolni a terhesség vagy szoptatás ideje alatt?

Ezen élethelyzetekben történő alkalmazásra vonatkozó tapasztalatok nem állnak rendelkezésre.