

har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på en overdosering er mavesmerter og kraftig diarré med øget væske og elektrolyttab.

Ved akut overdosering kan ses blod i urin og afføring samt blødning fra livmoderen.

Ved længerevarende overdosering kan udvikles leverbetændelse.

Hvis du har glemt at tage Linella

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Fortsæt behandlingen som anvist.

4. Bivirkninger

Linella kan, som al anden medicin, give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Ubehag i maven inkl. mavekramper og mavesmerter samt misfarvning af urinen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Luftvejsgener, løbende næse og astma, øget væsketab og elektrolytforstyrrelser.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Allergiske reaktioner, herunder risiko for anafylaktiske reaktioner.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfæl-

de optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl lægen eller apoteket hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under »bivir-

knings« på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Sådan opbevarer du Linella

Opbevar Linella utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Linella ved almindelig temperatur.

Anvend ikke Linella efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Linella, tabletter indeholder

De virksomme indholdsstoffer er ekstrakt af

frangulabark (ekstraktionsmiddel er methanol 85%) og ekstrakt af sennesblad (ekstraktionsmiddel er ethanol 30% eller methanol 100% og methanol 60%) i alt svarende til 8,4 mg hydroxyanthracenderivat, kommenfrugt (+ olie) 20 mg, røllike 10 mg og hørfrø 10 mg. De øvrige indholdsstoffer er: Calciumhydrogenphosphat, mikrokrySTALLINSK cellulose, vandfri kolloid silica, calciumstearat, laktosemonohydrat og flydende, spraytørret glukose.

Udseende og pakningsstørrelser

Linella er en rund grønbrun tablet.

Linella findes i pakningsstørrelser á 60 stk. og 120 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Dronania GmbH, Karl-Benz-Str. 3., D-86825 Bad Wörishofen, Tyskland

Repræsentant for Danmark

Medica Clinical Nord Danmark A/S, Korskildeeng 4 – DK-2670 Greve, tlf. +45 4611 6669

Fremstiller

Dronania GmbH, Karl-Benz-Str. 3., D-86825 Bad Wörishofen, Tyskland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2008

Information om

LINELLA, tabletter

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Linella er et naturlægemiddel. For at opnå den bedste behandling, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Linella, tabletter.

– Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

– Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

– Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Øversigt over indlægssedlen.

1. Linellas virkning og hvad du skal bruge det til.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Linella.

3. Sådan skal du tage Linella.

4. Bivirkninger.

5. Sådan skal du opbevare Linella.

6. Yderligere oplysninger.

1. Linellas virkning og hvad du skal bruge det til.

Linella er et naturlægemiddel, der bruges til kortvarig brug ved forstoppelse.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Linella.

Tag ikke Linella hvis du:

– er overfølsom over for frangulabark, sennesblad, kommenfrugt, røllike, hørfrø, planter af kurveblomstfamilien (krysanthemum, bynke) eller ét eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Linella.

– har forsnævninger i mave-tarmkanalen eller andre tilstande, der kan forhindre en normal passage gennem mave-tarmkanalen.

– lider af kronisk betændelse af tarmslimhinden (Morbus Crohns sygdom, colitis ulcerosa).

– har blindtarmsbetændelse.

– har mavesmerter af ukendt årsag.

– forstyrrelser i væske- og elektrolytbalancen (f.eks. ved diarré).

Ekstra forsigtighed med brugen af Linella

Linella er ikke egnet til daglig anvendelse i længere tid (mere end 1 uge).

Linella bør kun anvendes, hvis tilstrækkelig effekt ikke kan opnås ved diæt.

Forsigtighed tilrådes ved forstoppelse.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, natur-

lægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Fortæl altid lægen hvis du bruger anden medicin. Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling.

Ved langvarigt misbrug af afføringsmidler kan der opstå for lav kaliumkoncentration i blodet, som kan medføre en øget virkning af lægemidler mod hjerterytmeforstyrrelser.

Samtidig indtagelse af lægemidler der sænker kaliumkoncentrationen i blodet (f. eks. vanddrivende lægemidler), binyrebarkhormoner eller lakridsrod kan øge risikoen for elektrolyt-forstyrrelser.

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af

Linella og Linella kan påvirke virkningen af andre lægemidler. Dette er normalt uden praktisk betydning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom så spørg lægen eller apoteket.

Brug af Linella sammen med mad og drikkevarer

Linella kan tages sammen med mad og drikke, gerne før sengetid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Linella, hvis du er gravid.

Amning:

Du må ikke tage Linella, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Linella påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Linella

Indeholder laktose og glukose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galaktoseintolerans, særlig form af hereditær laktosemangel (Lapp Lactine deficiency) eller glukose/galaktosemalabsorption.

3. Sådan skal du tage Linella

Voksne: 2-3 tabletter daglig i højst 1 uge, gerne før sengetid.

Børn under 12 år må kun få Linella efter

lægens anvisning.

Ældre: Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage en anden dosis, skal du altid følge lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det vides ikke, om nedsat lever- eller nyrefunktion eller andre særlige sygdomme indebærer, at forsigtighed bør udvises. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for meget Linella

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Linella end der står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen