

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Mielőtt elkezdene a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót.

E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírás szerű alkalmazása.

Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

Dr. Kleinschrod's Spasmi Tropfen

20 ml

Hatás, tulajdonság:

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását a több évtizedes felhasználói tapasztalat és népgyógyászati alkalmazás igazol. A készítmény komponensei közül a köménymagot, az édesköményt, a cickafarkfüvet külön-külön is régóta használják csecsemők és gyermekek szélbántalmainak és hasgörcseinek megszüntetésére. A cseppek hatóanyagai közül elsősorban az illóolajok és a flavonoidok a felelősek a görcsoldó hatásért. Az illóolajok gyomorszekréciót fokozó hatását kiegyéssítik a fehér ürömfű keserűanyagai.

Mit tartalmaz a csepp?

100 ml oldat az alábbi gyógynövények kivonatait tartalmazza:

10,0 g libapimpó (*Anserinae herba*), 2,0 g fehér ürömfű (*Artemisiae herba*), 1,0 g citromfű (*Melissae folium*), 2,0 g macskagyökér (*Valerianae radix*), 1,0 g kamilla (*Matricariae flos*), 1,0 g cickafarkfű (*Millefolii herba*), 1,0 g Uzarae radix, 0,5 g édeskömény (*Foeniculi amari fructus*), 0,1 g köménymag (*Carvi fructus*).

Mit tartalmaz még a csepp?

A készítmény 40 v/v % etanolt tartalmaz.

Mikor ajánlott a csepp szedése?

Ha Önnek gyomor-, bél-, epe- vagy vesegörcsei vannak, ezek oldására, felfúvódás, haspuffadás megszüntetésére ajánlott a csepp alkalmazása. Migrén és menstruáció során fellépő fájdalom csökkentésére, valamint ilyen esetekben a gyógyszeres kezelés kiegészítésére is javasolt a csepp.

Mikor nem javasolt a készítmény szedése?

Ha a készítmény bármely összetevőjével szembeni egyéni túlérzékenységre fennáll – főleg édeskömény (anetol, fenkon), fészkes-virágzatúak – ne szedje a készítményt.

Mit kell tudnia a szedés megkezdése előtt?

Tudnia kell, hogy orvosolandó problémái milyen eredetűek. Amennyiben bizonytalan a tünetek okában, kérdezze meg orvosát és gyógyszerészét.

Szedhetik-e a gyermekek is a cseppeket?

A készítmény biztonságos alkalmazása 12 éves kor felett javasolt.

Szedhető-e más gyógyszerekkel együtt a görcsoldó készítmény?

Ha Ön olyan gyógyszert/eket szed, melyek alkalmazása mellett tilos az alkohol fogyasztása, ne szedje a cseppet.

A készítmény etanol tartalma miatt óvatosságot igényel alkalmazása, nyugtatószerek, altatók, gyulladáscsökkentők, izomlazítók, cukorbetegség gyógyszerei mellett. A cseppek alkalmazása lehetőleg ne egyidőben történjen más gyógyszer szedéssel, legalább 2–3 óra szünet legyen a két bevétel között. Más gyógyszerekkel történő együtt-adás tiltására vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

Mit kell megfontolnia várandósság vagy szoptatás ideje alatt?

A készítmény etanol tartalma miatt káros lehet várandósság ideje alatti alkalmazása, szoptatás ideje alatti alkalmazásáról kérjen tanácsot szakembertől (orvos, védőnő, stb).

Hogyan és mikor kell alkalmazni a cseppeket?

Javasolt adag: Felnőtteknek naponta 3-6-szor 10-30 csepp
Gyermekeknek 12-16 év között 3-5-ször 10-20 csepp

A készítményt kevés vízben vagy meleg tejben elkeverve célszerű bevenni. Használat előtt felrázandó!

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a csepp?

A javasolt adagolás mellett – esetleges egyéni túlérzékenységen kívül, nem várt hatás nem ismeretes. Minden gyógyhatású szer alkalmazása során előfordulhatnak nem kívánt mellékhatások. Ha Ön ilyet észlel, hagyja abba a csepp szedését.

Mire kell még ügyelnie a csepp alkalmazása során?

A készítmény 40 v/v % etanolt tartalmaz, melynek 1 adagja 10–30 csepp, 0,10–0,30 g etanolnak felel meg. Alkalmazása káros lehet májbetegség, agysérülés és más központi idegrendszeri betegségek (epilepszia), alkohol-elvonókúra mellett.

Kúraszerű alkalmazás során az alkoholfogyasztás megszorítása javasolt.

Mennyi ideig szedhető a csepp?

Amennyiben a cseppek szedése során – a tünetek erősségétől függően – panaszai nem csökkennek, ill. nem szűnnek meg 3–5 nap után sem, keresse fel orvosát.

Hogyan kell tárolni a cseppeket?

Legfeljebb 25 °C-on.

Minden használat után gondosan zárja be a gyógyszeres üveget!

Gyermekek elől elzárva tartandó!

Csomagolási egység: 20 ml

Nyilvántartási szám: OGYI-267/1992

Forgalomba hozatali engedély jogosultja: Dronania Traditionelle Arzneimittell aus Bad Wörishofen GmbH, Karl-Benz-Str. 3, D-86825 Bad Wörishofen, Deutschland.

Magyarországon forgalmazza: Volmix Kft.

1146 Budapest, Thököly út 76.